

Rosenson-Score - Punkteschema für die Diagnostik von Statin-assoziierten Muskelbeschwerden (SAMS)		
Klinische Symptomatik	Punkte	Punkte Patientin
<b>Lokalisation/Verteilung</b>		
symmetrische Hüftbeuger/Oberschenkel	3	
symmetrisch Wade	2	2
symmetrisch Schultergürtel	2	
unspezifisch asymmetrisch, intermittierend	1	
<b>Zeitlicher Zusammenhang mit Beginn der Statin-Einnahme</b>		
Symptome nach < 4 Wochen	3	3
Symptome nach 4-12 Wochen	2	
Symptome nach > 12 Wochen	1	
<b>Nach Absetzen</b>		
Besserung innerhalb von < 2 Wochen	2	2
Besserung innerhalb von 2-4 Wochen	1	
keine Besserung nach > 4 Wochen	0	
<b>Reexposition</b>		
Symptome treten innerhalb von < 4 Wochen wieder auf	3	3
Symptome treten innerhalb von 4-12 Wochen wieder auf	1	
<b>Diagnose Statin-assoziiertes Muskelbeschwerden</b>	<b>Punkte gesamt</b>	
wahrscheinlich	9-11	10
möglich	7-8	
unwahrscheinlich	<7	